



Behavioral Health and
Recovery Services



TRATAMIENTO ASISTIDO POR MEDICAMENTOS

STANISLAUS COUNTY

BHRS

LINEA DE CRISIS
ACCESO Y APOYO
1-888-376-6246

TABLA DE CONTENIDO

Tratamiento asistido por medicamentos.....	3
Medicamentos comúnmente aprobados por la FDA para MAT	4
Opciones de tratamiento	5
Comparación de medicamentos para el trastorno por consumo de opioides	6
Comparación de medicamentos para el trastorno por consumo	8
Comparación de medicamentos para el trastorno por consumo de opioides	10
Reversión de sobredosis.....	12
Naloxona (Narcan).....	12
Otras sustancias de alcohol.....	13
Medicamentos comunes recetados para tratar la abstinencia síntomas	14
MAT y asesoramiento	15
Resumen del tratamiento asistido por medicamentos	15
Requisitos de centros para trastornos por consumo de sustancias (SUD) el tratamiento de adicciones asistido por medicamentos	16
Conceptos erróneos frecuentes sobre MAT	17
Recursos comunitarios para el tratamiento asistido por medicamentos	19
Referencias	21

Tratamiento asistido por medicamentos

¿Qué es el tratamiento asistido por medicamentos (MAT)?


El tratamiento asistido por medicamentos (MAT) es un enfoque comprobado que combina medicamentos con asesoramiento y terapias conductuales para tratar los trastornos por consumo de sustancias (SUD). Ayuda a las personas a alcanzar y mantener una recuperación exitosa.

Beneficios del tratamiento asistido por medicamentos (MAT)

Se ha demostrado que MAT es muy eficaz para ayudar a las personas a recuperarse de los trastornos por consumo de sustancias. Cuando estos medicamentos se prescriben y controlan correctamente, son seguros y asequibles. Reducen significativamente el riesgo de sobredosis, ayudan a controlar las ansias y los síntomas de abstinencia, mejoran la calidad de vida y pueden favorecer la recuperación a largo plazo.

Beneficios del tratamiento asistido por medicamentos para mujeres embarazadas y lactantes

MAT ofrece importantes beneficios para las mujeres embarazadas y lactantes que luchan con el trastorno por consumo de sustancias. MAT puede controlar los síntomas de abstinencia y las ansias, lo cual es importante tanto para la salud de la madre como para la del bebé. MAT reduce el riesgo de complicaciones durante el embarazo al promover un estilo de vida más saludable y proporciona un mejor resultado tanto para la madre como para el bebé. Para las mujeres lactantes, los medicamentos MAT se consideran seguros cuando son recetados por un médico y permiten a las mujeres amamantar mientras reciben el tratamiento.



Medicamentos comúnmente aprobados por la FDA para MAT

MAT para el trastorno por consumo de opioides (OUD): Buprenorfina y productos a base de Buprenorfina, Metadona y Naltrexona

MAT para el trastorno por consumo de alcohol (AUD): Naltrexona, Acamprosato, Disulfiram

MAT para el trastorno por consumo de tabaco (TUD): Terapia de reemplazo de Nicotina, Vareniclina, Bupropión

Prevención de sobredosis: Naloxona



Opciones de tratamiento

Programa de Tratamiento de Narcóticos (NTP), también conocido como Programas de Tratamiento de Opiáceos (OTP) Están disponibles Metadona, Buprenorfina, Bupropión, Vareniclina, Naltrexona, Acamprosato, Disulfiram y terapia de reemplazo de nicotina.

Los medicamentos aprobados por la FDA están disponibles para los participantes inscritos en el programa con trastorno por consumo de opioides.

Consultorio médico/Atención primaria/Hospital

Están disponibles Buprenorfina, Naltrexona, terapia de reemplazo de nicotina, Vareniclina, Disulfiram, Acamprosato y Bupropión.

Programa comunitario/Centro de tratamiento de trastornos por consumo de sustancias

Están disponibles Buprenorfina, Naltrexona, terapia de reemplazo de nicotina, Vareniclina, Disulfiram, Acamprosato y Bupropión.

Programa de telesalud

Están disponibles Buprenorfina y Naltrexona. Se pueden ofrecer otros servicios. Poblaciones atendidas: adultos y jóvenes de 12 a 17 años.

Farmacia

Terapia de reemplazo de nicotina y naloxona.



Comparación de medicamentos para el trastorno por consumo de opioides

Características	Metadona	Buprenorfina	Naltrexona
¿Qué hace?	Reduce los antojos de opioides y minimiza los síntomas de abstinencia al bloquear los efectos eufóricos de los opioides	Bloquea los efectos de los opioides, reduce los síntomas de abstinencia y las ansias.	Bloquea la sensación de felicidad intensa y los efectos calmantes de los opioides.
Tipo de toma y frecuencia	<u>Oral</u> : Una vez al día	<u>Oral</u> 1-2 veces al día <u>Subcutáneo</u> : Cada 26 días o una vez al mes	<u>Intramuscular</u> Cada 28 días o una vez al mes
Formas de uso común	Líquido	Película/Comprimido/Inyección	De liberación prolongada Inyección
Beneficios	<ul style="list-style-type: none"> • No se requiere desintoxicación de opioides antes de que empiece el • Opción de tratamiento a largo plazo 	<ul style="list-style-type: none"> • Disminuye la recaída • Reduce las barreras frente al tratamiento 	<ul style="list-style-type: none"> • Esquema de medicación flexible • No hay síntomas de abstinencia si se interrumpe el tratamiento
Riesgos	<ul style="list-style-type: none"> • La interacción con benzodiazepinas puede aumentar el riesgo de sobredosis • La interacción con el alcohol puede aumentar el riesgo de sobredosis 	<ul style="list-style-type: none"> • Precaución al tomar medicamentos opioides, benzodiazepinas, alcohol u otros depresores del sistema nervioso central mientras está tomando SUBLOCADE • Posibilidad de mal uso o abuso (Subutex) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tolerancia reducida a opioides que puede aumentar el potencial de una muerte por sobredosis • Alergia: Individuos que hayan presentado previamente hipersensibilidad a la Naltrexona

Características	Metadona	Buprenorfina	Naltrexona
Cuándo empezar	En cualquier momento	El paciente debe tener síntomas de abstinencia leves-moderados	Se requiere mínimo 7-14 días de abstinencia de opioides
Potencial de sobredosis	Alto-Moderado	Mínimo	Ninguno
¿Quién puede proporcionar tratamiento y dónde?	<p>Programa de tratamiento de opioides/Programas de tratamiento de narcóticos</p> <p>Metadona solo está disponible a través de un OTP/NTP</p> <p><i>Los medicamentos aprobados por la FDA están disponibles para los participantes inscritos en un programa con trastorno por consumo de opioides.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los profesionales que cuenten con un registro actual de la DEA que incluya autoridad para la Lista III, en su práctica, si lo permite la legislación estatal aplicable • OTP/NTP, consultorio médico de atención primaria, sala de emergencias de un hospital, centro comunitario de tratamiento de trastornos por uso de sustancias y programas de telesalud. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cualquier proveedor de atención médica que tenga licencia para recetar • OTP/NTP, consultorio médico de atención primaria, sala de emergencias de un hospital, centro comunitario de tratamiento de trastornos por uso de sustancias y programas de telesalud.

Comparación de medicamentos para el trastorno por consumo

Características	Naltrexona	Disulfiram	Acamprosato
¿Qué hace?	Reduce las ansias y bloquea la sensación de felicidad intensa que el <u>alcohol</u> le da a una persona.	Bloquea la descomposición del alcohol en el cuerpo. Lo que provoca efectos secundarios desagradables.	Estabiliza las señales químicas en el cerebro, que normalmente se interrumpen durante la adicción al alcohol.
Tipo de toma y frecuencia	<u>Oral</u> A diario Inyección Cada 28 días o una vez al mes	<u>Oral</u> Una vez al día	<u>Oral</u> Tres (3) veces al día
Formas de uso común	Comprimido, inyección de liberación extendida, Inyección	Comprimido	Tableta de liberación retardada
Beneficios	<ul style="list-style-type: none"> ● No es adictivo ● Ayuda a reducir las ansias de alcohol 	<ul style="list-style-type: none"> ● Reduce las ansias del alcohol ● Red de seguridad para proteger contra el consumo impulsivo de alcohol 	<ul style="list-style-type: none"> ● Sin interacción con el alcohol ● Mayor eficacia cuando se combina con otros medicamentos AUD
Riesgos	<ul style="list-style-type: none"> ● No ayuda con la abstinencia al alcohol ● No previene la debilitación cuando se consume alcohol 	<ul style="list-style-type: none"> ● Provocará una fuerte reacción si se ingieren alcohol o productos alcohólicos ● El riesgo de recaída aumenta si no se toma diariamente 	<ul style="list-style-type: none"> ● Mayor riesgo de recaída si no se toma como se ha prescrito, ● Los comprimidos son de liberación retardada y no deben ser triturados, cortados o masticados

Características	Naltrexona	Disulfiram	Acamprosato
cuándo empezar	La recomendación es que comience una vez que haya dejado de beber alcohol activamente, para que el tratamiento sea más efectivo.	<u>Debe</u> estar libre de alcohol por 12 horas antes de administrarlo.	Desintoxicación: <ul style="list-style-type: none"> • Muy recomendable 2-7 días después de dejar el alcohol. • No es obligatorio pero es altamente beneficioso.
Potencial de sobredosis	Ninguno	Posible	Mínimo
¿Quién puede proporcionar tratamiento y dónde?	<ul style="list-style-type: none"> • Cualquier proveedor de atención médica que tenga licencia para recetar • <i>OTP/NTP, consultorio médico de atención primaria, sala de emergencias de un hospital, centro comunitario de tratamiento de trastornos por uso de sustancias y programas de telesalud</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Cualquier proveedor de atención médica que tenga licencia para recetar • <i>OTP/NTP, consultorio médico de atención primaria, sala de emergencias de un hospital, centro comunitario de tratamiento de trastornos por uso de sustancias y programas de telesalud</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Cualquier proveedor de atención médica que tenga licencia para recetar • <i>OTP/NTP, consultorio médico de atención primaria, sala de emergencias de un hospital, centro comunitario de tratamiento de trastornos por uso de sustancias y programas de telesalud</i>

Comparación de medicamentos para el trastorno por consumo de opioides

Características	Terapia de reemplazo de nicotina (NRT)	Bupropión	Vareniclina
¿Qué hace?	Reduce los síntomas de abstinencia de la nicotina.	Reduce los síntomas de abstinencia y disminuye las ansias	Reduce los síntomas de abstinencia y disminuye las ansias
Tipo de toma y frecuencia	<u>Oral</u> A diario <u>Nasal</u> Diariamente, según sea necesario <u>Cutáneo</u> A diario	<u>Oral</u> Diariamente 1-2 veces al día	<u>Oral</u> Diariamente 1-2 veces al día
Formas de uso común	Nasal aerosol/oral Inhalador/Chicle, Pastillas/Parches	Comprimido	Comprimido
Beneficios	<ul style="list-style-type: none"> • Mejora de la salud física • Abstinencia 	<ul style="list-style-type: none"> • Puede ser beneficioso en personas con depresión • Previene la abstinencia de nicotina 	<ul style="list-style-type: none"> • La reducción de la dosis no es necesaria • Reduce las ansias y previene la abstinencia
Riesgos	<ul style="list-style-type: none"> • Precaución de uso para personas con problemas cardíacos • Alergia al parche 	<ul style="list-style-type: none"> • Precaución de uso en personas con problemas hepáticos • Precauciones de uso en personas con trastornos convulsivos 	<ul style="list-style-type: none"> • Precaución puede reducir la tolerancia al alcohol • Riesgo de suicidio
Cuándo empezar	Varía según el tipo y la forma de terapia	Comience la terapia 1-2 semanas antes de dejar de consumir tabaco	Comience la terapia 1 semana antes de dejar el tabaco

Características	Terapia de reemplazo de nicotina (NRT)	Bupropión	Vareniclina
¿Quién puede proporcionar tratamiento y dónde?	<ul style="list-style-type: none"> • No se necesita receta médica, la mayoría se obtienen en el mostrador • Cualquier proveedor de atención médica que tenga licencia para prescribir • <i>Diversos entornos como clínicas médicas, farmacias, supermercados, OTP/NTP y en línea.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Cualquier proveedor de atención médica que tenga licencia para prescribir • <i>OTP/NTP, consultorio médico, médico de atención primaria, urgencias hospitalarias, centro de tratamiento de trastornos por consumo de sustancias en la comunidad y programas de telesalud.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Cualquier proveedor de atención médica que tenga licencia para prescribir • <i>OTP/NTP, consultorio médico, médico de atención primaria, urgencias hospitalarias, centro de tratamiento de trastornos por consumo de sustancias en la comunidad y programas de telesalud.</i>

Reversión de sobredosis

Las sustancias tratadas consisten en cualquier opiode recetado, heroína, fentanilo, metadona, morfina y codeína.

Naloxona (Narcan)

Revierde los efectos de una sobredosis de opioides.

Beneficios

- Revierde los efectos de una sobredosis de opioides en 2 a 3 minutos.
- Previene la muerte.
- Es seguro administrarlo a cualquier persona (niño, adulto, embarazada o lactante).
****Si bien no se ha estudiado en profundidad la seguridad del medicamento para el feto, administrar naloxona es crucial para salvar la vida de la mujer, superando potencialmente el riesgo de abstinencia inducida y estrés fetal.***
- No es adictivo
- La Good Samaritan Law de California protege a quienes administran atención médica de emergencia, administración de Narcan.
- Se pueden administrar dosis múltiples si una dosis inicial de aerosol nasal Narcan es ineficaz.
- Accesible para cualquier persona, incluidos familiares, cuidadores y amigos.
- Cubierto por seguro y disponible sin receta o con receta.

Riesgos

- De acción corta; las personas deben buscar atención médica inmediata.

Si alguien no está sufriendo una sobredosis de opioides, Narcan no tendrá ningún impacto, por lo que hay poco riesgo en usarlo en una emergencia si no está seguro.



Otras sustancias de alcohol

Trastorno por consumo de estimulantes y metanfetaminas

Actualmente no existen tratamientos farmacológicos aprobados por la FDA para los trastornos por consumo de estimulantes. Actualmente se están realizando investigaciones sobre medicamentos para este trastorno. Las personas pueden hablar con su proveedor médico o proveedor de MAT sobre cómo controlar las ansias y los síntomas de abstinencia de este trastorno.

Trastorno por consumo de cannabis (marihuana) (CUD)

Actualmente no existe ningún tratamiento farmacológico aprobado por la FDA para el trastorno por consumo de cannabis. Actualmente se están realizando investigaciones sobre medicamentos para este trastorno. Las personas pueden hablar con su proveedor médico o proveedor de MAT sobre cómo controlar las ansias y los síntomas de abstinencia de este trastorno.



Medicamentos comunes recetados para tratar la abstinencia síntomas

- **Acetaminofen o ibuprofeno:** Ayuda con dolores musculares o de cabeza. No se necesita receta médica y se puede comprar en el mostrador.
 - **Clonidina (Catapres):** Ayuda a reducir la ansiedad, la agitación, la sudoración, los dolores musculares y los calambres. *Se necesita prescripción médica.*
 - **Diciclomina (Bentyl):** Ayuda a reducir el dolor abdominal y relaja el tracto gastrointestinal. *Se necesita la receta médica de un médico.*
 - **Hidroxicina (Atarax):** Ayuda a reducir la ansiedad y la inquietud. *Se necesita la receta médica de un médico*
 - **Librium, Ativan u otras benzodiazepinas:** Ayuda con la ansiedad y la agitación. Se utiliza Librium para el manejo de la abstinencia de alcohol. Otras benzodiazepinas se utilizan para la abstinencia de opioides. *Se necesita la receta médica de un médico.*
 - **Loperamida (Imodium):** Ayuda con las heces blandas asociadas con la abstinencia. No se necesita receta médica y se puede comprar en el mostrador.
 - **Ondansetrón (Zofran):** Ayuda a controlar las náuseas y los vómitos. *Se necesita la receta médica de un médico.*
- Esta lista no está completa; se pueden proporcionar otros medicamentos a discreción de los proveedores médicos.***



MAT y asesoramiento

El asesoramiento es importante para tratar los trastornos por consumo de sustancias, junto con la medicación. El asesoramiento ofrece a las personas la oportunidad de hablar con un profesional, ya sea de forma individual o en grupos con compañeros que atraviesan desafíos similares. A través del asesoramiento, las personas pueden explorar las razones y los comportamientos que contribuyeron a su trastorno por consumo de sustancias, adquiriendo conocimientos sobre formas de vida más saludables y desarrollando habilidades para apoyar la recuperación a largo plazo. El asesoramiento proporciona apoyo y motivación para mantener el compromiso con el tratamiento, además de enseñar estrategias prácticas para tomar decisiones positivas, manejar los contratiempos y lidiar con el estrés. Los grupos de asesoramiento y apoyo grupales también ofrecen una comunidad de apoyo donde las personas pueden conectarse con otros, hacer nuevos amigos y encontrar solidaridad en su recuperación.

Si bien el asesoramiento es muy útil cuando se combina con MAT, si las personas no están preparadas para recibir asesoramiento, es posible que igualmente reciban servicios de medicación.

Resumen del tratamiento asistido por medicamentos


El tratamiento asistido por medicamentos (MAT) se ha estudiado ampliamente y ha demostrado ser eficaz para reducir el consumo de sustancias, mejorar el funcionamiento general y reducir el riesgo de recaída. En comparación con los tratamientos tradicionales solos, MAT muestra consistentemente resultados superiores en la recuperación del trastorno por consumo de sustancias. Ofrece un enfoque seguro y personalizado para personas en distintos niveles de gravedad de adicción, garantizando una atención personalizada. MAT es exitoso a largo plazo y se puede administrar tanto en entornos ambulatorios como hospitalizados, brindando flexibilidad y accesibilidad a quienes buscan recuperarse de los trastornos por uso de sustancias.



Requisitos de centros para trastornos por consumo de sustancias (SUD) el tratamiento de adicciones asistido por medicamentos

Los establecimientos que brindan servicios de recuperación o tratamiento de SUD deben cumplir con los siguientes requisitos de MAT:

- **Acceso a MAT:** A los miembros se les deben ofrecer servicios MAT directamente o ser referidos efectivamente a un proveedor de MAT.
- **Elección de medicamentos:** Los miembros pueden usar su medicamento MAT preferido si tanto el prescriptor como el miembros aceptan que es clínicamente beneficioso.
- **No discriminación:** No se puede negar el acceso a las instalaciones a los miembros por utilizar medicamentos MAT prescritos.
- **No hay cambios obligatorios en la medicación:** Los miembros no están obligados a cambiar su medicación MAT para recibir servicios de tratamiento.
- **Soporte continuo:** Las instalaciones deben apoyar a los miembros que deseen continuar con sus medicamentos MAT actuales.
- **No hay obligación de modificar la medicación:** No se puede obligar a los miembros a reducir o interrumpir el tratamiento, disminuir la dosis o suspender su medicación MAT para ingresar o permanecer en la instalación.
- **No se requiere participación en el servicio:** A los miembros no se les pueden negar los medicamentos MAT por no participar en todos los servicios ofrecidos.
- **No se permite la denegación por consumo de sustancias:** A los miembros no se les pueden negar medicamentos MAT debido al consumo de sustancias o al mal uso.



Conceptos erróneos frecuentes sobre MAT

1. **¿Existen pruebas de que el tratamiento MAT es mejor que la abstinencia?**
 - ◆ **Hecho:** MAT se basa en evidencia y se recomienda como tratamiento de primera línea para la adicción a los opioides por parte de múltiples organizaciones autorizadas, entre ellas la Academia Estadounidense de Psiquiatría de Adicciones, la Asociación Médica Estadounidense, entre otros.
2. **MAT reemplaza una adicción con otra**
 - ◆ **Hecho:** MAT integra medicamentos aprobados por la FDA con terapias conductuales para tratar eficazmente los trastornos por consumo de sustancias, minimizando las ansias y apoyando la recuperación sostenida, en contraste con la creencia equivocada de que se trata simplemente de sustituir una adicción por otra.
3. **MAT es un enfoque único para todos.**
 - ◆ **Hecho:** MAT utiliza varios medicamentos adaptados a diferentes necesidades, como agonistas como la Metadona, agonistas parciales como la Buprenorfina y antagonistas como la Naltrexona, para minimizar las ansias y controlar la abstinencia de opioides y alcohol. Además, se emplean medicamentos como la TRN, el Bupropión y la Vareniclina para reducir las ansias y la abstinencia de nicotina.
4. **MAT es solo para el corto plazo**
 - ◆ **Hecho:** Las investigaciones respaldan que MAT es eficaz para la recuperación a largo plazo y se observaron resultados óptimos en personas que recibieron tratamiento durante al menos 1 o 2 años.
5. **MAT es una solución a largo plazo y las personas tomarán medicación para siempre**
 - ◆ **Hecho:** MAT no es un compromiso de por vida para todos; la duración del tratamiento varía según el progreso individual y la gravedad de la adicción, con el objetivo de reducir la dependencia a lo largo del tiempo.
6. **La adicción no es lo suficientemente grave como para requerir MAT**
 - ◆ **Hecho:** MAT es adecuado para una amplia gama de niveles y tipos de adicción, utilizando diferentes opciones de medicación adaptadas a necesidades individuales.
7. **MAT solo perturbará y obstaculizará el proceso de recuperación**
 - ◆ **Hecho:** Se ha demostrado que MAT ayuda a la recuperación mejorando la calidad de vida, el funcionamiento y el manejo del estrés, reduciendo en última instancia las tasas de mortalidad.
8. **MAT aumenta el riesgo de sobredosis**
 - ◆ **Hecho:** MAT reduce el riesgo de sobredosis al estabilizar a los

individuos y prevenir situaciones que amenazan la vida post-desintoxicación.

9. MAT no es bueno para el embarazo

- ◆ **Hecho:** MAT es seguro y se recomienda para mujeres embarazadas con trastorno por consumo de opioides para controlar los síntomas de abstinencia y garantizar mejores resultados tanto para la madre como para el bebé. Las mujeres embarazadas con otros trastornos por consumo de sustancias deben consultar con su médico el tratamiento adecuado.

10. Dejar la adicción de golpe vs. MAT

- ◆ **Hecho:** La interrupción abrupta ("de golpe") puede causar síntomas de abstinencia graves y es menos eficaz para controlar las ansias en comparación con el MAT, que favorece la recuperación al satisfacer la necesidad del cerebro de esa sustancia.

11. La mayoría de los planes de seguro no cubren MAT

- ◆ **Hecho:** Los programas médicos estatales cubren al menos un medicamento MAT, y muchos cubren los tres (metadona, buprenorfina y naltrexona), y las leyes federales garantizan la paridad en cobertura de tratamientos de salud mental y consumo de sustancias.



Recursos comunitarios para el tratamiento asistido por medicamentos

Acceso a la línea de crisis y asistencia

Servicios: Disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Apoyo, asistencia y recursos para la recuperación, servicios de salud mental y trastornos por consumo de sustancias.

Teléfono: 1-888-376-6246

Centro de tratamiento Aegis (programa de tratamiento de opioides)

Modesto: MAT (todos los medicamentos

aprobados por la FDA) Ubicación: 1235

McHenry Ave Suite A Modesto CA 95350

Teléfono: (209) 527-4597

Horario: Lun-Vie: 5:30 a.m. a 7:00 p.m. (solo medicamentos hasta las 6:00 p.m.); Sábados (solo medicamentos): 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

11:00 a.m.

Ceres: MAT (todos los medicamentos

aprobados por la FDA) Ubicación: 1768

Mitchell Rd Suite 301 Ceres CA 95307

Teléfono: (209) 353-4838

Horario: Lun-Vie 5:30 a.m. a 1:30 p.m. y festivos 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

Turlock: MAT (Todos los medicamentos aprobados por la FDA)

Ubicación: 1651 Lander Ave. Suite 1651 Turlock CA. 95380

Teléfono: (209) 353-4838

Horario: Lun-Dom y festivos 6:00 a.m.-11:00 a.m.

www.aegistreatmentcenters.com

Bicycle Health: MAT (Buprenorfina y

Naloxona) Ubicación: 93110 Calle

Modesto CA 95354 Teléfono: 1-888-400-1559

Telesalud y en línea

Horario: Lun-Vie 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

www.bicyclehealth.com

Departamento de Emergencias del Bridge Program Doctors Medical Center: MAT

(Buprenorfina y Naloxona) Ubicación: 1441 Florida Ave. Modesto CA 95350

Teléfono: (209) 408-1605 Navegador de uso de sustancias

Stanislaus Recovery Center

Evaluation and Medication Access Clinic: MAT (Todos los medicamentos

aprobados por la FDA, excepto metadona)

Ubicación: 1904 Richland Ave Building B, Room 112 Ceres CA.

95307 Teléfono: 1-888-376-6246

Horario: Lun-Vie 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Golden Valley Health Centers: MAT (Buprenorfina, Naloxona) Ubicación: 2101 Tenaya Dr. Modesto CA 95354

Teléfono: (209) 722-4842 ext. 5127 (cita previa) (209) 576-6766 (oficina) Horario: Lun-Sáb 8:00 a.m. a 5:00 p.m.


www.gvhc.org

Recover Medical Group: MAT (Buprenorfina, Naltrexona)

Ubicación: 120 Birmingham Drive, 240A, Cardiff by the Sea, CA 92007-1757 Teléfono: (858) 208-0121.

Poblaciones atendidas: adultos y jóvenes de 12 a 17 años, telesalud y en línea

www.letsrecover.com



Referencias

Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA):

Esta agencia es responsable de supervisar y administrar programas de salud mental, prevención del abuso de drogas y tratamiento de la adicción a las drogas en todo el país. El Centro para la Prevención del Abuso de Sustancias y el Centro para el Tratamiento del Abuso de Sustancias son parte de SAMHSA. www.samhsa.gov
www.samhsa.gov/prevention

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC): El Centro Nacional para el Control y la Prevención de Lesiones de los CDC ayuda a proteger la salud de los Estados Unidos rastreando lesiones y muertes para buscar tendencias peligrosas, investigando las mejores formas de prevenir lesiones y violencia, desarrollando estrategias de prevención, evaluando la efectividad de las estrategias de prevención y apoyando a los estados en la implementación de programas.

www.cdc.gov/injury

Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA): NIDA realiza y difunde los resultados de investigación sobre los efectos de las drogas en el cuerpo y el cerebro. NIDA es una excelente fuente de información sobre la adicción a las drogas.

www.nida.nih.gov

El Centro Nacional de Información Biotecnológica promueve la ciencia y la salud proporcionando acceso a la información biomédica y genómica.

www.ncbi.nlm.nih.gov

Alkermes: Vivitrol (Naltrexona en suspensión inyectable de liberación prolongada)

www.vivitrolhcp.com



STANCOBHRS



Behavioral Health and
Recovery Services

Nuestra visión es seguir siendo líderes en salud conductual y ser reconocidos por la excelencia en nuestra comunidad, estado y nación.

En asociación con nuestra comunidad, nuestra misión es brindar y gestionar servicios efectivos de prevención y salud conductual que promuevan la capacidad de la comunidad para lograr resultados de bienestar, resiliencia y recuperación.

www.stanislausrecoverycenter.com